

Gonoreja

Uzrokuje je *Neisseria gonorrhoeae*, bakterija koja se javlja u 0,1 do 0,5% svih ginekoloških pacijentica. To je klasična spolno prenosiva bolest (triper) i veoma je raširena među adolescentima, promiskuitetnim osobama i homoseksualcima. U Hrvatskoj je 5 do 10% ginekoloških upala vezano za gonoreju. Pretpostavlja se da je gonokok uzročnik 40% cervicitisa (upala vrata maternice) i oko 60% salpingitisa (upala jajovoda). Osim u genitalnom traktu žene uzročnik gonoreje se nalazi u mokraćnoj cijevi, rektumu i ždrijelu.

Česti su oblici tihih upala (asimptomatska upala).

Kakvi su simptomi?

Nakon prvog kontakta rizik upale je 50%, a inkubacija traje 3 do 5 dana. Javlja se žučkasto-zelenkasti gnojni gusti iscijedak, krvarenje te učestalo i bolno mokrenje. Često se javlja u kombinaciji s drugim spolno prenosivim bolestima, klamidijom i trihomonasom. Ukoliko se infekcija širi u gornje dijelove genitalnog trakta nastaje endometritis (upala maternice), salpingitis (upala jajovoda) te posljedično tuboovarijalni apsesi. Javljuju se bolovi u trbuhi i povišena temperatura. Kod duljeg trajanja infekcije i daljnog širenja nastaju upale zglobova, osip po koži, vrlo rijetko upala moždanih ovojnica i endokarditis. U trudnoći uzrokuje korioamnionitis, prijevremeno prsnuće vodenjaka i prijevremeni porod.

Infekciji pogoduje menstruacija te intrauterini uložak („T“, Cooper, Mirena).

Kako se postavlja dijagnoza?

Izdvajanjem kultura mikroorganizma iz mokraćnog sustava i pregledom pod mikroskopom vlažnog preparata, može se uzeti obrisak cerviksa i radi kultura bakterija (imunofluorescentni testovi).

Liječenje:

Provodi se s azitromicinom, doksiciklinom, eritromicinom, amoksicilinom i ofloksacinom.

Uvijek treba „energično“ liječiti oba partnera!