

Mikoplazma i ureaplazma

Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis su organizmi između bakterija i virusa, a nazivaju se još i molikuti. Često se nalaze u donjem spolnom sustavu žene. U rodnici i vratu maternice može ih se naći u 30 do 90% žena koje nemaju simptome infekcije.

Kako se prenosi?

Put prijenosa je spolni. Naseljavanje genitalnog trakta mikroorganizmima počinje nakon puberteta i ovisi o seksualnoj aktivnosti. Nakon stupanja u seksualne odnose učestalost mikoplazme u genitalnom traktu je 17%, a ureaplazme do 75%. Zanimljivo je da se u djevojaka koje nisu imale spolni kontakt mikoplazma izolira u 1%, a ureaplazma u 5% slučajeva.

Koji su simptomi?

Javlja se pojačan vaginalni iscijedak, bolovi u donjem dijelu trbuha te bolovi kod spolnog odnosa. Može se javiti peckanje pri mokrenju te učestalo mokrenje, sve do povišene temperature, mučnine, povraćanja i ozbiljnih bolova u trbuhu. Kod asimptomatskih infekcija pojavljuje se neznatno pojačani vaginalni iscijedak.

Koja je posljedica infekcije?

Infekcija ovim mikroorganizmima povezuje se s neplodnošću, infertilitetom te komplikacijama u trudnoći. To posebno vrijedi za pobačaj, prijevremenih porođaj i zastoj u rastu i razvoju djeteta.

Kako se postavlja dijagnoza?

Uzročnici se izoliraju iz cerviksa i uretre u odgovarajućim kulturama.

Liječenje se provodi s doksiciklinom, azitromicinom, eritromicinom te ciprofloksacinom.