

Uputa za prikupljanje uzoraka prije izvođenja testa na okultno krvarenje u stolici (Hemokult)

Ovim testom nastojimo otkriti okultno (prikriveno, neprimjetno) krvarenje u gastrointestinalnom traktu koje ima za posljedicu pojavu oku nevidljivih tragova krvi (hemoglobina) u stolici. Postupak testiranja sastoji se od dvije faze koje provode pacijent i zdravstveni (laboratorijski) djelatnik. Prvu fazu postupka provodi pacijent kod kuće na način da pravilno prikupi uzorku stolice.

Što trebate znati prije prikupljanja uzoraka stolice za testiranje okultnog krvarenja?

- ❖ 48 sati prije testiranja nije preporučeno uzimati lijekove (npr. aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroide i dr.) koji mogu dovesti do iritacije crijeva i pojave krvi u stolici, te alkohol.
- ❖ u slučaju proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i pojave krvi u mokraći, odgodite testiranje najmanje 3 dana.

Postupak: Potrebno je uzeti po dva mala uzorka s različitim mjestima na površini tri **uzastopne** stolice u odgovarajuće posudice (*npr. uzorke stolice I u posudicu I, uzorke stolice II u posudicu II, uzorke stolice III u posudicu III*). Označite posudice imenom i prezimenom.

Pohranite posudice s uzorcima stolice u hladnjaku (najduže 5 dana) i odmah nakon uzimanja treće stolice dostavite u laboratorij.